


BIFIDUS BL®

Promueve defensas saludables



Las enfermedades respiratorias y las gastroenteritis virales son las enfermedades más significativas en los lactantes:¹

1 de cada 4 lactantes sufre infecciones recurrentes.



Son la causa más común del uso de antibióticos.

Las **bifidobacterias** son un grupo microbiano dominante en el lactante sano amamantado, entre ellas, **B. lactis** ha demostrado beneficios clínicamente significativos en el tratamiento y la prevención de enfermedades diarreicas y alérgicas infantiles en poblaciones de riesgo, como:¹

Lactantes en guarderías que no son amamantados



Lactantes en riesgo de hiperreactividad del sistema inmunitario




Pacientes hospitalizados



En pequeños suplementados con B. lactis desde 1 mes hasta los dos años de vida, se reportaron **menos infecciones respiratorias, síntomas gastrointestinales, otitis media y fiebre Vs. placebo.**¹

Ocurrencia de enfermedades durante dos años de tratamiento (Riesgo relativo)



● Infecciones respiratorias ● Otitis media aguda ● Fiebre ● Infecciones gastrointestinales



GOOD START® Y GOOD CARE® contienen los HMOs 2'FL y LNnT, además de BIFIDUS BL®, que otorgan una INMUNIDAD SUPERIOR¹⁻³

*En comparación con una fórmula sin HMO. 2'FL y LNnT han demostrado disminuir la incidencia de sintomatología de infecciones, y el uso de antipiréticos y antibióticos por esta causa, en comparación con pacientes alimentados con una fórmula infantil con inmunonutrientes, pero sin HMO. **Marcas Registradas** usadas bajo licencia de su titular Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 353, 1800 Vevey, Suiza. UTILÍCESE BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA. **NOTA IMPORTANTE:** Creemos que la lactancia materna es el comienzo nutricional ideal para los bebés, ya que la leche materna proporciona una dieta equilibrada y protección contra enfermedades para el bebé. Apoyamos plenamente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, seguida de la introducción de alimentos complementarios nutritivos adecuados junto con la lactancia materna sostenido hasta los dos años de edad. También reconocemos que la lactancia materna no siempre es una opción para los padres. Recomendamos a los profesionales de la salud que informen a los padres sobre las ventajas de la lactancia materna. Si los padres consideran no amamantar, los profesionales de la salud deben informarles que tal decisión puede ser difícil de revertir y que la introducción de la alimentación parcial con biberón reducirá el suministro de leche materna. Los padres deben considerar las implicaciones sociales y financieras del uso de fórmula infantil. A medida que los bebés crecen a ritmos diferentes, los profesionales de la salud deben aconsejar sobre el momento adecuado para que el bebé comience a comer alimentos complementarios. La fórmula para lactantes y los alimentos complementarios siempre deben prepararse, usarse y almacenarse según las instrucciones de la etiqueta para evitar riesgos para la salud del bebé. **REFERENCIAS:** 1. Taipale T. *Pediatr Res.* 2016;79:65-69. 2. Vandenplas Y. *Nutrients.* 2018 Aug 24;10(9):1161. GOOD CARE® 3 no es un sustituto de la leche materna, sino un alimento a base de leche, especialmente desarrollado para niños sanos a partir del año de edad. GOOD START® 1: NWHPB257. GOOD START® 2: LWHPB259-1. GOOD CARE® 3: JWPB016-1.