



# ¿Por qué incluir *L. Confortis*<sup>®</sup> en NAN<sup>®</sup> Optimal Pro?

1

La microbiota de los lactantes es muy inestable, y se ve afectada por factores como el modo de nacimiento o la alimentación con fórmula infantil.<sup>1</sup>



*Lactobacillus reuteri* es un componente autóctono de la microbiota intestinal humana.<sup>1</sup>

2

3


*L. Reuteri* fue encontrado en la leche humana, aislado y patentado como *L. Confortis*<sup>®</sup> por Nestlé<sup>®</sup> para integrarlo a la alimentación de los lactantes que no son amamantados.



4


A menudo, los neonatos a término muestran señales de intolerancia digestiva a las fórmulas infantiles sin probióticos.<sup>2</sup>

5



Una intervención temprana con *L. Confortis*<sup>®</sup> apoya la modulación de la comunidad microbiana intestinal, incrementando la diversidad para apoyar la digestión y la barrera intestinal.<sup>1</sup>

NAN<sup>®</sup> Optimal Pro, con una combinación exclusiva de ingredientes que apoyan la salud digestiva.<sup>3-5</sup>



PROTEÍNA OPTIMIZADA OPTIPRO<sup>®</sup>



OLIGOSACÁRIDOS DE LA LECHE HUMANA 2'FL



PROBIÓTICO *L. CONFORTIS*<sup>®</sup> probiótico patentado por Nestlé<sup>®</sup> que fortalece la barrera intestinal

Marcas registradas usadas bajo licencia de su titular, Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 353, 1800 Vevey, Suiza. Utilícese bajo supervisión médica. **NOTA IMPORTANTE:** Creemos que la lactancia materna es el comienzo nutricional ideal para los bebés, ya que la leche materna proporciona una dieta equilibrada y protección contra enfermedades para el bebé. Apoyamos plenamente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, seguida de la introducción de alimentos complementarios nutritivos adecuados junto con la lactancia materna sostenida hasta los dos años de edad. También reconocemos que la lactancia materna no siempre es una opción para los padres. Recomendamos a los profesionales de la salud que informen a los padres sobre las ventajas de la lactancia materna. Si los padres consideran no amamantar, los profesionales de la salud deben informarles que tal decisión puede ser difícil de revertir y que la introducción de la alimentación parcial con biberón reducirá el suministro de leche materna. Los padres deben considerar las implicaciones sociales y financieras del uso de fórmula infantil. A medida que los bebés crecen a ritmos diferentes, los profesionales de la salud deben aconsejar sobre el momento adecuado para que el bebé comience a comer alimentos complementarios. La fórmula para lactantes y los alimentos complementarios siempre deben prepararse, usarse y almacenarse según las instrucciones de la etiqueta para evitar riesgos para la salud del bebé. **Referencias:** 1. Garcia Rodenas, C. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2016;63(6):681-687. 2. Happy Tummy Consortium. Nutrients. 2023 Jan 19;15(3):530. 3. Nutten S. Nestle Nutr Inst Workshop Ser. 2016;86:1-10. 4. Reverri EJ, Devitt AA, Kajzer JA, Baggs GE, Borschel MW. 2018;10(10):1346. 5. Mu Q, Tavella VJ, Luo XM. Front Microbiol. 2018;9:757. **NAN<sup>®</sup> 3 Optimal Pro** no es un sustituto de la leche materna, sino un alimento a base de leche, especialmente desarrollado para niños sanos a partir de 1 año de edad. **NAN<sup>®</sup> 4 Optimal Pro** no es un sustituto de la leche materna, sino un alimento a base de leche, especialmente desarrollado para niños sanos a partir de 2 años de edad. NWPB126, LWPB042-1, JWPB018, JWPB020. **C4.7INF-OPTIMAL-HCPDIG-9/23-128**